

予防接種

2023.10

対象疾病	ワクチン	接種回数/接種間隔	効果・持続期間	料金(消費税込)
A型肝炎	エイムゲン	3回 (2回目2-4週後/3回目24週後)	・2回接種後4週目で抗体陽転率ほぼ100%。 ・2回接種で約18か月抗体保持。 ・3回接種で約5年間抗体保持。	¥8,800
B型肝炎	ヘプタックス-II	3回 (2回目4週後/3回目20-24週後)	・3回接種で約90%は抗体獲得。 ・3回接種で通常2-3年間有効。(個人差あり) ・3回接種しても抗体ができない場合もあるが、3回目接種より6-12か月経過後追加接種することにより30-40%が抗体獲得。	¥6,600
破傷風	沈降破傷風トキシイド	3回 (2回目3-8週後/3回目12-18か月後)	・3回接種でほぼ完全な免疫状態が得られ、約10年間抗体レベルを維持。 ・基礎免疫完了者(3回接種)でも破傷風の恐れがある場合、更に接種が必要。	¥4,400
狂犬病	ラビピュール筋注用	3回 (2回目1週後/3回目3-4週後)	・2回接種後に抗体陽転率ほぼ100%、約6か月持続。 ・3回接種で12-18か月の予防効果が期待。	¥16,500
日本脳炎	ジェービックV	3回 (2回目1-4週後/3回目12か月後)	・3回接種で多量の抗体が作られ、約5年間抗体持続。	¥6,600
麻疹/風疹	乾燥弱毒生麻疹風疹混合ワクチン(MR)	1回(接種2週間後抗体出現)	・1回接種で抗体陽転率95%以上、約10年間抗体持続。 ・妊婦は不可。(妊娠していない場合でも、接種後2か月の避妊が必要。)	¥11,000
	乾燥弱毒生麻疹ワクチン(M)			¥6,600
	乾燥弱毒生風疹ワクチン(R)			¥6,600
おたふく	乾燥性おたふく風ワクチン	1回	・1回の接種により90%以上の割合で免疫を獲得。	¥6,600
肺炎球菌	ニューモバックスNP	1回	・接種後約1ヶ月で抗体価がピークになり、約5年後に80%程度に低下するが、その後も効果は維持される。	¥9,900
インフルエンザ	インフルエンザHAワクチン	1回(接種2週間後抗体出現)	・約2週間で抗体がつき、1か月後に抗体価がピークになり、約5か月間有効。	¥4,400
帯状疱疹ワクチン(50歳以上)	ビケン(弱毒性水痘ワクチン)	1回・皮下注射	・免疫機能に異常のある方や、免疫抑制を来たす病気や治療を受けている方は接種できません。	¥7,500
	シングリックス	2回(2ヶ月間隔)・筋肉注射	・免疫機能低下している方でも接種可能です。	¥23,000 (1回分)

【特記事項】

※キャンセルはできませんので、ご都合が悪くなった場合は予約日時の変更をお申し出ください。

※接種間隔の起算日は接種した日の翌日とする。

※不活性化ワクチンについて、同時3種まで接種可。(生ワクチンを含む場合は要医師確認)

※帯状疱疹ワクチン接種時に、自治体の助成制度をご利用される方は事前にお住いの自治体にお問合せください。